

Nervrots- och facettledsblockader hos Evidia Farsta Röntgen

På Evidia Farsta Röntgen utför vi nervrots- och facettledsblockader på hals- och ländrygg, både i terapeutiskt och diagnostiskt syfte.

Till dessa undersökningar har vi hög tillgänglighet.

Varför blockad – förklaring av diagnos

Besvär från kotpelaren hos den vuxna befolkningen är mycket vanligt, en mindre andel av dessa kan vara lämpliga för operation. För att bedöma dessa personer används en kombination av klinisk test och röntgen samt selektiva blockader av nervrötter och facettleder. Blockader går även att använda för att lindra patientens besvär då operation anses olämpligt.

Diagnostisk nervrotsblockad

Denna undersökning utförs för att säkerställa vilken nervrot som utlöser besvären. Patienten bör ha smärtor eller andra besvär då blockaden läggs, annars kan man inte avgöra om den haft någon effekt.

Terapeutisk nervrotsblockad

Denna undersökning utförs för att ge en långvarig smärtlindring på den redan diagnostiserade nivån.

Facettledsblockad

Behandlar lokal smärta i rygg eller nacke pga degeneration i leden och kan vara både diagnostiska och terapeutiska.

Elektroniska remisser och svar

Vi erbjuder möjlighet till elektronisk remiss och svar mot flera journalsystem (t ex TakeCare och J4/Asynja) eller via Labportalen. Vill du ansluta dig till oss för elektroniska remisser och svar – kontakta i första hand support@evidia.se.

Välkommen att kontakta oss

Bokning/reception: 08-120 669 50

Evidia Farsta Röntgen

Karlandaplan 6
123 47 Farsta

Marie Hofer, enhetschef
Tel: 079-067 00 36
mail: marie.hofer@evidia.se

